

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	AVGUST - ECUADOR S.A. Matriz Daule: Avda. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07 oficina 702. Daule – Ecuador Teléfono: (+593) 4 6061360 Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Of. 306. Cumbayá, Quito, Ecuador. Teléfono: (+593) 2 6016 686
FORMULADO POR:	CHANGZHOU AUGUST AGROCHEM COMPANY LIMITED 301 Changjiang Road, Binjiang Chemical, Industry Zone, 213000, Changzhou, Jiangsu – China
CLASE:	FUNGICIDA AGRÍCOLA
FORMULACIÓN:	Suspensión Concentrada (SC)
REGISTRO NACIONAL N°:	
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	1 L, 4 L, 20 L y 200 L
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	 CATEGORÍA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO ATENCIÓN 

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Pyrimethanil600 g/l Aditivos c.s.p..... 1 l
MODO DE ACCIÓN:	Protectante y curativa
MECANISMO DE ACCIÓN:	Inhibe la síntesis de aminoácidos y proteínas, específicamente la inhibición de la biosíntesis de la metionina.

GRUPO QUÍMICO:	Anilino pirimidina		
CÓDIGO FRAC:	9		
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:	Solubilidad	Punto de fusión	Presión vapor
	110 mg/L a 25 °C	96.3 °C	1.1 mPa a 20°C
	Densidad	K _{OC}	PM
	1.19 g/ml	835	199.25 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	*P.C./días	**P.R./horas
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.5 l/ha	0	4
Rosas (<i>Rosa</i> sp.)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.75 ml/l	***N.A.	12

*P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

***N.A: No aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Banano: Se recomienda aplicar con el apareamiento de los primeros síntomas visibles de daño del patógeno; es decir con el umbral económico de piscas en estado -1, aplicándolo una vez por ciclo de cultivo.

Rosa: Se recomienda aplicar el producto por dos ocasiones en el cultivo de rosa en etapa de producción, con un umbral de 0.5% daño por moho gris/botón.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Para efectuar las aplicaciones se recomienda previamente calibrar la bomba de aplicación para determinar la cantidad de mezcla necesaria. Para la preparación de la mezcla se recomienda previamente regular el pH del agua y adicionar un adherente, luego diluir la cantidad de producto en 50% del agua y agitar hasta conseguir un caldo homogéneo, luego completar el volumen de agua requerido y agitar, finalmente adicionar un adherente.

Volúmenes de mezcla recomendados:

Banano: 80 L/ha

Rosas: 1200 L/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes. No mezclar con productos que contengan aluminio o materiales orgánicos. En caso de dudas, se recomienda efectuar una prueba preliminar a pequeña escala. No es fitotóxico para el cultivo recomendado a las dosis recomendadas bajo condiciones normales de aplicación.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas. AVGUST-ECUADOR S.A. Teléfono (02) 6016686 Quito.



Revisión	Fecha	Modificaciones
Primera	18-01-2022	ECU
Segunda	24-07-2024	ECU
Tercera	22/10/2024	ECU